

Національний університет цивільного захисту
України

Факультет оперативно-рятувальних сил

Бесіда куратора за темою:

**«1 грудня –
Всесвітній
день боротьби
зі СНІДом»**



1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

Згідно з рішенням Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та Генеральної Асамблеї ООН, прийнятими в 1988 році, відзначається Всесвітній Снідом. Цей день започатковано з метою підвищення обізнаності про епідемію СНІДу, викликаного поширенням ВІЛ-інфекції, а також як день пам'яті жертв цього захворювання. Темою Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом 2019 року оголошена «Співтовариства домагаються змін».

Що означає Червона стрічка?



Цей символ
антиСНІДівського
руху створив
художник
Франк Мур у квітні
1991 року
(він помер від СНІДу
через 3 роки).

УКРАЇНА І СНІД

2
місце

Україна займає
друге місце
в Європі за темпами
розповсюдження
ВІЛ / СНІДу



2 тисячі дітей в Україні народилося ВІЛ-позитивними,
з них чверть – зі стадією СНІД

60



Щодня діагноз ВІЛ
отримують майже 60 українців



Щодня від СНІДу в Україні
помирає 7 людей



10%

Необхідні ліки отримують
10% всіх інфікованих

ВІЛ-інфекція – інфекційне захворювання, яке викликає вірус імунодефіциту людини.

Характеризується багаторічною циркуляцією вірусу в організмі, який уражає імунну систему, що призводить до загибелі людини. Імунна система організму захищає нас від інфекцій і запобігає розвитку деяких типів злоякісних хвороб. ВІЛ повільно й незворотно знищує імунну систему організму

СНІД (синдром набутого імунодефіциту) – це кінцева стадія ВІЛ-інфекції

Що таке ВІЛ?

В – «Вірус» - збудник захворювання.

І – «Імунодефіциту» - відсутність захисної реакції, системи організму, яка забезпечує захист від мікроорганізмів, що спричиняють хворобу.

Л – «Людини».

Шляхи передачі ВІЛ:

- Статевим шляхом;
- Під час переливання крові;
- Від матері до дитини;
- Через нестерильні інструменти та шприци.

Сьогодні ВІЛ-інфекція повністю не виліковується, ліки які б знищували ВІЛ в організмі досі не винайдено.

Проте, вже нині є такі ліки, які запобігають зараженню дитини у лоні матері, полегшують перебіг ВІЛ-інфекції та запобігають розвиткові СНІДу.

Пам'ятайте, що зараження вірусом імунодефіциту людини можна уникнути. Щоб убезпечити себе і свою родину від зараження, кожній людині, перш за все, потрібні достовірні знання про ВІЛ-інфекцію і СНІД

ВІЛ поширюється від людини до людини

* При будь-яких статевих контактах, якщо не використано презерватив.

* При контакті з інфікованою кров'ю, наприклад під час використання нестерильних інструментів, шприців, голки для внутрішньовенного введення наркотиків, проколюванні мочки вуха, пірсінгу, татування, або переливанні крові чи контакті з відкритими виразками ВІЛ-інфікованого.

* Від ВІЛ-інфікованої матері до дитини під час вагітності, пологів або годуванні грудним молоком. Страх і неправдива інформація про ВІЛ-інфекцію спричиняють страждання в багатьох людей. Тому також важливо знати яка поведінка є безпечною по відношенню до ВІЛ-інфекції.

ВІЛ не передається:

- * Через рукоштовування, обійми чи перебування в товаристві інфікованої людини.
- * Через споживання їжі, приготованої ВІЛ-інфікованою людиною.
- * При навчанні або іграх з ВІЛ-інфікованими дітьми.
- * Через повітря.
- * Укуси комах або тварин.
- * Плавання у басейнах.

Що таке СНІД?

СНІД—кінцева стадія ВІЛ—інфекції

С – «**Синдром**» - ряд симптомів, що вказують на наявність якоїсь хвороби чи стану.

Н – «**Набутого**» - такого, що набутий протягом життя, а не від народження.

І – «**Імунного**» - стосується імунної системи, яка забезпечує захист людини від мікроорганізмів, що спричиняють хворобу.

Д – «**Дефіцит**» - в даному випадку відсутність захисної реакції імунної системи людини на наявність в організмі шкідливих бактерій.

Шляхи передачі СНІД:

- Статевим шляхом;
- Через кров та інші біологічні речовини;
- Перинатальним шляхом від матері до дитини.
- Через нестерильні інструменти та шприци .

Кожний, хто хоче знати, чи ВІЛ-інфікований він, чи ні, може безоплатно та анонімно здати кров на аналіз у кабінетах «Довіра», які є при Центрах профілактики СНІДу в кожному місті України.

Підозрілі симптоми, які можуть вказувати на потребу аналізу крові на ВІЛ :

1. це постійна гарячка,
2. частий пронос,
3. недостатнє збільшення або раптова втрата ваги тіла,
4. хронічне збільшення лімфатичних вузлів,
5. білі плями на оральній слизовій оболонці
6. і рецидивні або незвичайні інфекції.

ПАМ'ЯТАЙТЕ, що ви можете запобігти зараженню ВІЛ-інфекцією! Уникання ризикованої поведінки є найліпшим способом зберегти своє здоров'я і життя!

